

Intégration de la GATPA et les soins essentiels du nouveau-né

1. Préparer l'équipement nécessaire pour la femme et le bébé avant l'accouchement'
2. Préparer la seringue avec l'utérotonique.

Poser l'enfant sur le ventre de sa mère. Le sécher soigneusement et apprécier sa respiration. Mettre le bébé peau contre peau avec la maman. Jeter le linge humide.

Le bébé crie ou respire

- Couvrir le bébé et la maman avec un linge doux et sec ; veiller à ce que sa tête soit bien couverte (préférentiellement avec un chapeau).
- Informer la mère de l'état du bébé.
- Palper l'abdomen pour écarter l'éventualité de la présence d'un deuxième enfant

- Administrer l'utérotonique à la femme dans la minute qui suit l'accouchement, après s'être assuré de l'absence d'un ou d'autres fœtus .

- Sectionner le cordon ombilical une fois que les pulsations se cessent ou 2 à 3 minutes après la naissance du bébé, en prenant comme point de départ le premier des deux événements .
- Installer le bébé sur la poitrine de sa mère, peau contre peau.

- Exercer une traction contrôlée sur le cordon, tout en stabilisant l'utérus, pour effectuer la délivrance du placenta.
- Masser le fond utérin à travers la paroi abdominale.

Le bébé ne crie pas ou ne respire pas

Appeler à l'aide.

- Evaluer la respiration du bébé.
- Stimuler le bébé en le séchant.
- Veiller à ce que le bébé soit au chaud : Couvrir le bébé et la maman avec un linge doux et sec ; veiller à ce que sa tête soit bien couverte (préférentiellement avec un chapeau).
- Informer la mère de l'état du bébé.

Respire bien

- Informer la mère de l'état du bébé et de la GATPA.
- Administrer l'utérotonique à la femme dans la minute qui suit l'accouchement, après s'être assuré de l'absence d'un ou d'autres fœtus.

- Sectionner le cordon ombilical une fois que les pulsations se cessent ou 2 à 3 minutes après la naissance .
- Installer le bébé sur la poitrine de sa mère, peau contre peau.

- Exercer une traction contrôlée sur le cordon, tout en stabilisant l'utérus, pour effectuer la délivrance du placenta.
- Masser le fond utérin à travers la paroi abdominale.

Ne respire pas / hoquets

- Sectionner le cordon ombilical.
- Assurer la réanimation du nouveau-né.
- Si possible, administrer l'utérotonique à la femme dans la minute qui suit l'accouchement, après s'être assuré de l'absence d'un ou d'autres fœtus.

- Délivrer le placenta, de préférence avec une traction contrôlée du cordon et une contre-traction simultanée de l'utérus.

- Masser le fond utérin à travers la paroi abdominale.

Soins des yeux et du cordon; chaleur (contact peau contre peau); allaitement maternel
Surveillance + soins essentiels pour la femme et le bébé.