

## Entreposage des utérotoniques dans le dépôt de pharmacie

**D'après l'OMS  
l'ocytocine  
est  
l'utérotonique  
de choix pour la  
GATPA**



- Assurer la disponibilité des réserves adéquates d'utérotoniques et d'équipement à injection
- Vérifier les recommandations du fabricant en ce qui concerne l'entreposage de chaque utérotonique
- Assurer un système de surveillance des températures - enregistrer la température régulièrement dans le réfrigérateur de préférence aux moments les plus chauds de la journée (placer les thermomètres à différents coins du réfrigérateur)
- Assurer un système backup d'électricité pour les réfrigérateurs (exemple réfrigérateurs à gaz) et des glacières pour garder le stock à la température recommandée en cas de ruptures fréquentes de courant électrique
- Respecter la règle du premier-périmé-premier-sorti (PPPS) et maintenir un registre de suivi des dates de péremption pour diminuer le risque des pertes par péremption
- Entreposer le misoprostol à la température ambiante dans une boîte fermée, protégé contre l'humidité
- De préférence, conserver les utérotoniques injectables entre 2 et 8°C
- Conserver l'ergométrine et la syntométrine dans une boîte fermée dans le réfrigérateur, protégées contre la lumière et la congélation

## Entreposage des utérotoniques dans la salle d'accouchement

**D'après l'OMS  
l'ocytocine  
est l'utérotonique  
de choix pour la  
GATPA**



- **Vérifier les recommandations du fabricant en ce qui concerne l'entreposage de chaque utérotonique. En general:**
  - **L'ocytocine pourrait être conservée non réfrigérée pour une durée ne dépassant pas 3 mois à 30° C ou moins puis éliminée**
  - **L'ergométrine et la Syntométrine pourraient être conservées non réfrigérées pour une durée ne dépassant pas 1 mois à 30° C ou moins puis éliminées**
  - **Les ampoules d'ergométrine et de Syntométrine retirées de la réfrigération doivent être conservées dans une boîte fermée, à l'ombre, hors de la lumière du soleil**
  - **Le misoprostol doit être conservé à la température ambiante dans une boîte fermée, protégé contre l'humidité**
- **Enregistrer la température régulièrement dans la salle d'accouchement, de préférence au moment le plus chaud de la journée**
- **Retirer du frigo, de façon périodique, seulement la quantité suffisante pour le besoin anticipé**
- **Respecter la règle du premier-sorti-premier-utilisé (PSPU)**
- **Maintenir un registre de suivi d'entrées et de sorties des utérotoniques dans la salle d'accouchement**
- **N'enlever les fioles ou les ampoules de leurs boîtes que juste avant de les utiliser**
- **Ne pas laisser les utérotoniques injectables sur les plateaux ou dans les poches pendant des périodes indéfinies en attente d'utilisation**